



殺虫剤/樹幹注入剤

農林水産省登録  
第22050号

# アトラック<sup>®</sup>液剤

飛散しない!!  
樹木の  
害虫駆除剤

- 薬液の飛散がなく、散布が難しい場面でも安全にご使用できます。
- 注入した薬剤は速やかに分散し、長期間効果が持続します。
- 人畜毒性は「普通物」<sup>\*</sup>です。
- 樹幹部に開ける穴の大きさが小さく、数も少ないことから樹木への影響はわずかです。
- 大きな防除機材や水を必要とせず、騒音もなく周辺に飛散しないので、時刻や風向き等を気にすることなく施工できます。

※「普通物」とは、毒物及び劇物取締法に規定する、特定毒物、毒物、劇物のいずれにも該当しないものを指している通称

 井筒屋化学産業株式会社

 syngenta<sup>®</sup>

®はシンジェンタ社の登録商標

# 殺虫剤/樹幹注入剤

# アトラック<sup>®</sup>液剤

包装：600ml (60ml 注入専用容器入り×10本)  
紙箱入り  
成分：チアメトキサム…………… 4.0%  
有機溶剤、界面活性剤等…………… 96.0%  
毒物及び劇物取締法：非該当

## 適用害虫および使用方法


作物名	適用病虫害名	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
さくら	アメリカシロヒトリ	胸高直径(樹幹部) 6~10cm 30ml	幼虫発生前~ 幼虫発生期	3回以内	樹幹注入	3回以内
けやき		11~15cm 60ml				
まつ	16~20cm 90ml					
まつ	マツカレハ	21~25cm 120ml	新葉展開後			
		26~30cm 180ml				
プラタナス	プラタナス ゲンバイ	30cm以上は胸高直径 が5cm増すごとに30~ 60mlを増量する。				

## 標準注入量

胸高直径 (cm)	アトラック液剤 (本)
6~10	0.5
11~15	1
16~20	1.5
21~25	2
26~30	3
31~35	4
36~40	4
41~45	5
46~50	5

※本リーフレットの内容は、農薬登録のうち一部の内容を抜粋して記載しています。  
対象木の樹幹部にドリルを用いて穴を開け、その穴に本剤のノズルを挿入し薬剤を注入する。  
《ドリル刃/木工用直径6mm 穿孔角度/下方30~45度 穿孔深さ/5cm程度》  
ボトルの薬液が完全に空になったことを確認し、空ボトルを回収する。  
注入孔に癒合剤を充填し、さらに雨水等が侵入しないように被覆剤を塗布し、完全に密栓する。

### アメリカシロヒトリの発生消長と防除時期 (参考)




### アメリカシロヒトリ幼虫



- 注意事項
- さくらに使用する場合、落花直後や展葉初期には薬剤が分散しにくいので、葉が十分に展開してから処理してください。
  - ミツバチに影響があるので、開花期間中の注入は避けてください。
  - さくらにおいては早期落葉が発生することがあるので、銘木や老木等への使用は避けてください。
  - 花・葉・果実等を食用とするさくらには使用しないでください。

### マツカレハの発生消長と防除時期 (参考)



### マツカレハ幼虫



- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

【製造・販売】

**シンジェンタ ジャパン株式会社**  
ローン アンド ガーデン事業本部  
東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階  
TEL. 03-6221-3802 FAX. 03-6221-3899

【販売】

**井筒屋化学産業株式会社**  
熊本県熊本市西区花園1丁目11-30  
TEL. 096 (352) 8121  
FAX. 096 (353) 5083

【取扱い店】

**株式会社 イズカ**

〒693-0043 島根県出雲市長浜町337-13  
TEL (0853) 28-2688(代) FAX (0853) 28-2802  
E-mail: info@izuka.co.jp http://www.izuka.co.jp